


【カドサイラ療法について】

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	作用	投与量	時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
デキサート注 (初回のみ)	アレルギー予防、 吐き気止め	1.65mg/0.5mL 6.6 mg/2mL	15分 (初回 30分)																						
グラニセトン注	吐き気止め	3mg/100mL																							
カドサイラ注	抗がん薬	3.6mg/kg	30分 (初回 90分)																						
生理食塩液		250mL																							



治療による副作用

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
悪寒・発熱																								
血小板減少																								

心機能低下（治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。）
末梢神経障害（治療回数が増えると生じることがあります。しびれ感などがありましたらお知らせ下さい。）

点滴をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。
当院は、一部の薬剤にジェネリック医薬品及びバイオシミラーを使用しています。